



PROVA A

ISTRUZIONI: Segnare la risposta corretta con una X sulla lettera corrispondente. La risposta esatta è sempre e solo una. In caso di errore scrivere "NO" accanto alla risposta già barrata e segnare con una X la risposta corretta.

1) Quale scala si utilizza per la rilevazione del dolore in un paziente adulto collaborante?

- A. Barthel
- B. NRS**
- C. PAINAD
- D. Glasgow-coma scale

2) Le cure palliative hanno come obiettivo:

- A. Il miglioramento della qualità della vita in un paziente terminale**
- B. La possibilità di evitare una terapia chirurgica
- C. La riduzione delle dimensioni del tumore
- D. La prevenzione di recidive

3) La Broncopneumopatia cronico ostruttiva (BPCO):

- A. E' soggetta a frequenti riacutizzazioni con necessità di terapia antibiotica e steroidea
- B. E' un'ostruzione cronica parzialmente reversibile delle vie aeree
- C. Ha un'incidenza maggiore negli ex fumatori
- D. Tutte le precedenti alternative sono corrette**

4) Se durante una trasfusione di globuli rossi il paziente manifesta brividi, cefalea, dolori, sensazione di calore, è necessario immediatamente:

- A. Diminuire la velocità di infusione e chiamare il medico
- B. Sospendere la trasfusione, tenere la vena aperta con soluzione fisiologica e chiamare il medico**
- C. Diminuire la velocità di infusione e avvisare il servizio di emoteca
- D. Controllare i parametri vitali e chiamare il medico

5) Il codice deontologico è:

- A. Uno strumento per la difesa degli operatori sanitari
- B. Uno strumento che regola i comportamenti degli operatori sanitari
- C. Uno strumento per la difesa del lavoro
- D. Uno strumento di orientamento contrattuale

6) Ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza, chi è l'RSPP?

- A. Il Referente per la Sicurezza e il Piano di Protezione
- B. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- C. Il Rappresentante del Servizio per la Prevenzione e la Protezione
- D. Il Revisore dei Servizi di Protezione Periodica

7) Durante la somministrazione di nutrizione enterale il paziente:

- A. Deve mantenere una posizione prona
- B. Necessita di un controllo della glicemia almeno ogni due ore
- C. Deve mantenere la posizione semiseduta con lo schienale del letto inclinato di 30°-40°
- D. Deve essere sottoposto a terapia con procinetici

8) Il Clostridium Difficile è responsabile dell'infezione:

- A. Della mucosa vaginale
- B. Della mucosa intestinale
- C. Del tessuto cardiaco
- D. Della mucosa orale

9) L'attacco ischemico transitorio (TIA):

- A. Segue solitamente episodi di ictus
- B. Non presenta alterazioni della coscienza
- C. E' un episodio di deficit neurologico di durata inferiore alle 24 ore
- D. Ha come causa principale un'emorragia subaracnoidea

10) La definizione di emottisi è:

- A. Emissione di sangue dalle vie respiratorie attraverso la tosse
- B. Emissione di sangue dal cavo orale attraverso la tosse
- C. Emissione di sangue con le feci
- D. Emissione di sangue con il vomito



11) Al fine di migliorar egli scambi gassosi in un paziente affetto da BPCO non è indicato:

- A. Somministrare broncodilatatori
- B. Somministrare ossigenoterapia ad alti flussi**
- C. Monitorare emogasanalisi
- D. Tutti gli interventi precedenti sono indicati

12) La sindrome da immobilizzazione o da allettamento:

- A. E' una riduzione della funzionalità dei vari apparati, che si manifesta quando una persona è costretta al letto per lungo tempo.**
- B. Si manifesta in egual misura in giovani, adulti e anziani
- C. È un caratteristico desiderio dell'anziano di restare a lungo nel letto e a riposo
- D. Nessuna delle precedenti è corretta

13) Quando è richiesto il consenso informato?

- A. Negli interventi chirurgici
- B. Negli esami endoscopici
- C. Nella somministrazione di vaccini
- D. Tutte le precedenti alternative sono esatte**

14) Chi è il "Caregiver" ?

- A. Colui che fornisce assistenza e si prende cura di una persona non in grado di prendersi cura di sé**
- B. Il medico di Medicina Generale che si prende cura del suo assistito
- C. L'infermiere che si prende cura del paziente durante il periodo di degenza
- D. esclusivamente i parenti di primo grado

15) La manovra di Lesser viene utilizzata:

- A Durante l'iniezione intramuscolare per assicurarsi di non iniettare la soluzione in un vaso ematico**
- B. In caso di sublussazione della mandibola per liberare le vie aeree
- C. Introducendo soluzione fisiologica in un sondino nasogastrico per controllarne il corretto posizionamento
- D. Per la riduzione ematica di anidride carbonica attraverso la respirazione a labbra serrate

16) Per una corretta compilazione del registro di "carico/scarico" delle sostanze stupefacenti e psicotrope, è consentito l'utilizzo di:

- A. Penna indelebile ed in caso di errore cancellare con bianchetto
- B. Penna indelebile ed in caso di errore cancellare con bianchetto riscrivendo al fianco la richiesta corretta
- C. Penna indelebile, in caso di errore barrare con la penna sulla scritta (in modo tale da consentire la lettura sottostante) e controfirmare al fianco della correzione**
- D. E' consentita la compilazione del registro con la matita per agevolare la cancellazione e/o la modifica postuma

17) In quali casi gli aghi e altri oggetti taglienti monouso devono essere eliminati seguendo precauzioni atte a evitare punture e tagli accidentali?

- A. Solo quando sono stati utilizzati per pazienti HIV-positivi
- B. Solo nell'ambito del servizio di pronto soccorso
- C. Sempre, indipendentemente dalla natura del paziente sul quale sono stati impiegati
- D. E' previsto solo all'interno del reparto di malattie infettive ospedaliero

18) Il calibro del catetere vescicale si misura in:

- A. In Gauge
- B. In Mercier
- C. In Charrier
- D. Nessuna delle precedenti

19) L'anuria è:

- A. La produzione di urine ipercromiche
- B. La produzione di urina > 500 ml/24 ore
- C. La mancata produzione di urina
- D. Una patologia del sistema immunitario

20) Quale delle seguenti affermazioni sulla cartella clinica è falsa?

- A. Deve essere conservata illimitatamente
- B. E' un atto pubblico
- C. Ogni annotazione assume efficacia giuridica non appena viene trascritta
- D. Il coordinatore è responsabile delle verbalizzazioni eseguite dagli infermieri